

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**FINESSE 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larva de lepidópteros y otros minadores de hojas.

**FINESSE 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida. Utilizado para el control de larvas de lepidópteros y actúa paralizando a la larva el cual para de alimentarse en horas de ingestión y la muerte ocurre dentro de un máximo de 4 horas.

**Ingrediente Activo/Concentración:** Emamectin benzoato 50 g/kg  
**Grupo Químico:** Glicósido Lactone Macrocíclico  
**Clase de Uso:** Insecticida

**Tipo de formulación:** Gránulos dispersables (WG)

**Registro PQUA N°:** 1139 – SENASA  
**Titular del Registro:** CROP BUSINESS S.A.C.

**Formulado por:**  
**NORCHEM JIANGSU CORPORATION.**



Room 3101, West Tower, Fortune international building N° 359 Hongwu Road, Nanjing, China  
Teléfono: +86-25-84653194 Fax: +86-25-84658312

**Importado y distribuido por:**  
**CROP BUSINESS S.A.C.**  
Av. Melgarejo N° 580 Dpto301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

## 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

**Aspecto físico:** Sólido granulado blanco a beige de olor característico

**Densidad:** 0.6 g/ml a 20 °C

**pH:** 4.0 – 8.0

**Persistencia de espuma:** Máximo 20 ml después de 1 minuto

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Explosividad:** No explosivo

**Corrosividad:** No corrosivo



### 3. MODO DE ACCIÓN

**FINESSE 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas

**FINESSE 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida.

### 4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/Ha	Kg/cil		
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	-	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	-	7	0.01
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.15	-	7	0.02
Arándano	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.09	7	0.01
Palto	Gusano del Cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	0.07	3	0.01

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)  
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

**Presentaciones comerciales:** Bolsa x 0.1 Kg, Bolsas x 1 Kg, Caja x 1kg (incluye 10 sobres de 100 grs) y Bolsa x 25 Kg.

### 5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

**FINESSE 50 WG** debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega **FINESSE 50 WG**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

### 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

### 7. COMPATIBILIDAD

**FINESSE 50 WG** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

### 8. FITOTOXICIDAD

**FINESSE 50 WG** no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

### 9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

**Oral aguda, rata DL<sub>50</sub> :** 1516 mg/kg

**Dermal aguda, rata DL<sub>50</sub> :** > 2000 mg/kg

**Inhalatoria aguda, rata CL<sub>50</sub> :** > 5.0 mg/l;

**Irritación ocular:** No irritante en conejos

**Irritación dermal:** No irritante en conejo

**Sensibilización:** No sensibilizante

**Categoría Toxicológica:** III. Ligeramente Peligroso - Cuidado

### 10. PRECAUCIONES DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398  
0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)

CISPROQUIM

