

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**CYBOR 75 WP** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Dentro de la planta tiene acción sistémica y translaminar. Inhibe la síntesis de quitina interfiriendo en los procesos de muda y empupamiento del insecto (metamorfosis). Es eficaz en el control de larvas de dípteros minadores de hoja que atacan diversos cultivos.

**Ingrediente Activo/Concentración:** Ciromazina 750 g/Kg

**Grupo Químico:** Triazinas

**Clase de Uso:** Insecticida

**Tipo de formulación:** Polvo mojable (WP)

**Registro PQUA N°:** 1476 – SENASA

**Titular del Registro:** CROP BUSINESS S.A.C.

**Formulado por:**

**RIDACHEM HONGKONG LIMITED**

N° 29-31 Chueng Lee St. Chaiwan Hongkong

Teléfono: +86-25-8457 4660

**Importado y distribuido por:**

**CROP BUSINESS S.A.C.**

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

## 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

**Aspecto físico:** Polvo Blanco o blanquecino sin olor

**Densidad:** 0.6-0.65 g/ml a 20 °C

**pH:** 0.3 – 0.4 g/ml

**Persistencia de espuma:** Máximo 30 ml después de 1 minuto

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Explosividad:** No explosivo

**Corrosividad:** No corrosivo

### 3. MODO DE ACCIÓN

**CYBOR 75 WP** es un insecticida que interfiere en los procesos de la muda, el empupamiento normal y la posterior formación del adulto; en conjunto, interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas.

**CYBOR 75 WP** es eficaz sobre las larvas que han adquirido resistencia a los insecticidas convencionales.

### 4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	0.3	35	1.0
Tomate	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.1	0.3	14	1.0

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

**Presentaciones comerciales:** Bolsa x 0.1 Kg y 1 Kg.

### 5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **CYBOR 75 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.

Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

### 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

### 7. COMPATIBILIDAD

**CYBOR 75 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

### 8. FITOTOXICIDAD

CYBOR 75 WP no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

### 9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

**Toxicidad aguda / estudios de irritación:**

**Oral aguda, rata DL50:** > 2000 mg/kg ;

**Dermal aguda, rata DL50:** > 2000 mg/kg;

**Inhalatoria aguda, rata CL 50:** 5.0 mg/l;

**Ojos:** No irritante en conejos

**Piel:** No irritante en conejos

**Sensibilización:** No es un sensibilizante cutáneo en cobayos

**Categoría Toxicológica:** III. Ligeramente Peligroso – Cuidado

### 10. PRECAUCIONES DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

### 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

**CICOTOX:** 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

**CISPROQUIM:** 0800-5-0847

**ESSALUD:** 117 (gratuito)