

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BUNKER 480 SC es un herbicida sistémico y selectivo que es absorbido principalmente por las raíces aunque también es absorbido por las hojas.

BUNKER 480 SC puede ser aplicado en pre o en post emergencia del cultivo.

Ingrediente Activo/Concentración: Metribuzin

Grupo Químico: Dinitroaniline

Clase de Uso: Herbicida

Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)

Registro PQUA N° 2181 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:



SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD. E-TONG

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

Teléfono: +86-21-51698968

Fax: +86-21-64138597

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 – Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa La Molina – Lima

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido blanco de olor característico

Densidad: 1.16 gr/ml a 20 °C

pH: 6.0-7.0

Incompatibilidad: Con productos alcalinos

Estabilidad: Estabilidad por dos años

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. MODO DE ACCIÓN

BUNKER 480 SC actúa a nivel de la cadena transportadora de electrones entre los fotosistemas, en consecuencia la fotosíntesis se ve afectada y como resultado la maleza muere.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | L/Ha | | |
| Espárrago | Coquito | <i>Cyperus rotundus</i> | 0.3 | 28 | 0.1 |
| | Gramma china | <i>Sorghum halepense</i> | | | |
| | Pata de gallina | <i>Eleusine indica</i> | | | |
| | Verdolaga | <i>Portulaca oleracea</i> | | | |
| Papa | Chamico | <i>Datura stramonium</i> | 0.3 – 0.4 | 60 | 0.6 |
| | Lechera | <i>Euphorbia hirta</i> | | | |
| | Yuyo | <i>Amaranthus hybridus</i> | | | |
| | Lengua de vaca | <i>Rumex crispus</i> | | | |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Frascos x 0.25 L, 0.5 L y 1 L, Galonera x 4 L y 5 L, Bidón x 10 L y 20 L, Cilindro x 200 L

5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar **BUNKER 480 SC** en los periodos iniciales del desarrollo de las malezas.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada hasta transcurridas 12 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

BUNKER 480 SC, es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, sin embargo se debe evitar su mezcla con productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

8. FITOTOXICIDAD

BUNKER 480 SC no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

10. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

CISPROQUIM 0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)