

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BUTACROP 600 EC es un herbicida selectivo pre-emergente utilizado en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas, ciperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha.

Ingrediente Activo/Concentración: Butachlor 600 g/L

Grupo Químico: Chloroacetamida.

Clase de Uso: Herbicida

Tipo de formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

Registro PQUA N°: 1962 – SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

No.26 Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 – CHINA

Teléfono/Fax: 0086 25 83303203

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido violeta claro
Olor:	Leve olor aromático
pH:	5.0-7.0
Densidad:	1.10-1.15 g/ml
Punto de inflamación:	45 °C. Inflamable
Corrosividad	No corrosivo
Explosividad	No explosivo

3. MODO DE ACCIÓN

BUTACROP 600 EC es un herbicida que tiene como ingrediente activo al Butachlor de origen natural, perteneciente al grupo químico de las Cloroacetamidas. es un herbicida selectivo para pre-emergencia y/o control de post-emergencia temprana de una variedad de hierbas indeseables y seleccionadas como las malezas de hoja ancha en arroz trasplantado y siembra directa.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plagas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	4.0	N.A	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Frasco x 1 L, Galonera x 4 L y 5 L, Bidón x 10 L y 20 L, Cilindro 200 L.

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **BUTACROP 600 EC** en pre-emergencia de las malezas antes de siembra para un control general y antes de emergencia del cultivo después de siembra o transplante. Se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña/2 por año.

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

BUTACROP 600 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

BUTACROP 600 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Toxicidad aguda:

Oral aguda, DL50: > 5000 mg/kg

Dermal aguda, DL50: > 4000 mg/kg;

Inhalatoria aguda, CL50: > 5.0 mg/l;

Irritación dermal: Moderadamente irritante

Irritación ocular: Levemente irritante

Sensibilización: Leve sensibilizante cutáneo

10. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evitar contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa
- contaminada.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las
- primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para
- consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No reutilizar el envase vacío.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

CISPROQUIM 0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)