

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CYMONEB 78 PM es un fungicida de amplio espectro de acción protectante y curativa, para el control de "Hielo" o "Rancho" en el cultivo de papa y de "Mildiú" en cebolla.

Ingrediente Activo/Concentración: Propineb 700 g/kg + Cymoxanil 80 g/Kg

Grupo Químico: Ditiocarbamato (Propineb)
Acetamidas (Cymoxanil)

Clase de Uso: Fungicida

Tipo de formulación: Polvo Mojable (WP)

Registro PQUA N°: 1606– SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD



No.26 Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 – CHINA

Teléfono/Fax: 0086 25 83303203

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 – Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina – Lima

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Polvo

Densidad: 0.3 - 0.4

pH: 4.0 – 8.0

Inflamabilidad: No Inflamable

Explosividad: No Explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. MODO DE ACCIÓN

CYMONEB 78 PM es una mezcla de dos fungicidas: Propineb y Cymoxanil

El ingrediente activo Propineb actúa principalmente interfiriendo en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos. Este modo de múltiples sitios de acción impide el desarrollo de resistencia lo que es complementada con el efecto de Cymoxanil, que actúa inhibiendo el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas, dañadas e impide el desarrollo de los haustorios e inicia las respuestas, como la decoloración de las células infectadas y el colapso de las células adyacentes, para confinar al patógeno para el sitio inicial de la infección.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L		
Papa	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2* 0.05**
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.4-0.5	7	0.2* 0.5**
Tomate	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4-0.5	7	3.0* 0.2**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

*Propineb **Cymoxanil

Presentaciones comerciales: Bolsa x 0.5 kg, 1kg y 25 kg

5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

El momento oportuno de su aplicación será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

CYMONEB 78 PM se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido, luego aplicar

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CYMONEB 78 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

CYMONEB 78 PM no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Toxicidad oral aguda, LD50 > 3000 mg/kg;

Dermal aguda, LD50 > 2150 mg/kg;

Inhalatoria aguda, LC 50 (4h) > 5.0 mg/l;

Piel: Ligeramente irritante

Ojos: Ligeramente irritante

Sensibilización: ligeramente sensibilizante cutáneo en cobayos

Categoría Toxicológica: III. Ligeramente Peligroso - Cuidado

10. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para
- ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398 ESSALUD: 117 (gratuito) CISPROQUIM 0800-5-0847

