

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**FIPROKILL 200 SC** es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión en los insectos.

**FIPROKILL 200 SC** presenta un buen efecto residual después de su aplicación permitiendo un efectivo control de las plagas.

**Ingrediente Activo/Concentración:** Fipronil 200 g/L

**Grupo Químico:** Fenilpirazoles

**Clase de Uso:** Insecticida

**Tipo de formulación:** Suspensión Concentrada (SC)

**Registro PQUA N°:** 776 – SENASA

**Titular del Registro:** CROP BUSINESS S.A.C.

**Formulado por:**

**NANJING RHONQUIM CO., LTD.**

No.26 Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 – CHINA

Teléfono/Fax: 0086 25 83303203



**Importado y distribuido por:**

**CROP BUSINESS S.A.C.**

Av. Melgarejo N° 580 Dpto301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

## 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

**Aspecto físico:** Suspensión líquida blanco a crema con ligero olor

**Densidad:** 1.05±0.05 g/ml at 20°C

**pH:** 5.0 – 7.0

**Persistencia de espuma:** Máximo 30 ml después de 1 minuto

**Inflamabilidad:** No inflamable

**Explosividad:** No explosivo

**Corrosividad:** No corrosivo



### 3. MODO DE ACCIÓN

**FIPROKILL 200 SC** es un insecticida de aplicación foliar, utilizado para el control de diferentes plagas en diversos cultivos. Tiene acción sistémica en la planta. En los insectos actúa por contacto e ingestión.

**FIPROKILL 200 SC** actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, causando hiperexcitabilidad y convulsiones en el insecto.

### 4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20	14	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	21	0.01
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.25	14	0.01
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.20 - 0.25	7	0.01

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

**Presentaciones comerciales:** Frasco x 0.25 L, 0.5 L y 1 L, Galonera x 4 L y 5 L, Bidón x 20 L y Cilindro 200 L

### 5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

**FIPROKILL 200 SC** debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga- cultivo.

**FIPROKILL 200 SC** se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total. Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de la plaga.

## 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

## 7. COMPATIBILIDAD

FIPROKILL 200 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

## 8. FITOTOXICIDAD

FIPROKILL 200 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

## 9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Oral aguda, rata DL<sub>50</sub>: 1127 mg/kg

Dermal aguda, rata DL<sub>50</sub>: 2495 mg/kg

Inhalatoria aguda, rata CL<sub>50</sub>: 1.07 mg/l;

Irritación ocular: Ligeramente irritante en conejos

Irritación dermal: No irritante en conejos

Sensibilización: No es un sensibilizante cutáneo en cobayos

**Categoría Toxicológica: II. Moderadamente Peligroso – Dañino**

## 10. PRECAUCIONES DE USO

- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

**CICOTOX:** 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398  
0800-5-0847

**ESSALUD:** 117 (gratuito)

**CISPROQUIM**