

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**INDOXACROP 150 SC** es un insecticida de amplio espectro de acción que actúa por contacto e ingestión.

**INDOXACROP 150 SC** provoca temblores, cese de la alimentación, la parálisis y la muerte posterior del insecto plaga.

**Ingrediente Activo/Concentración:** Indoxacarb 150 g/L

**Grupo Químico:** Oxadiazina

**Clase de Uso:** Insecticida

**Tipo de formulación:** Suspensión concentrada (SC)

**Registro PQUA N°:** 1710 – SENASA

**Titular del Registro:** CROP BUSINESS S.A.C.

**Formulado por:**

**NANJING RHONQUIM CO., LTD**



**No.26 Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 – CHINA**

**Teléfono/Fax:** 0086 25 83303203

**Importado y distribuido por:**

**CROP BUSINESS S.A.C.**

**Av. Melgarejo N° 580 - Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina – Lima**

## 2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

**Apariencia:** Líquido blanco a crema

**Olor:** Ligero olor característico

**pH:** 5.0 – 8.0

**Densidad:** 1.0–1.1 g/ml

**Inflamabilidad:** No Inflamable

**Corrosividad:** No corrosivo

**Explosividad:** No explosivo

**Estabilidad:** Este producto es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

## 3. MODO DE ACCIÓN

**INDOXACROP 150 SC** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Es un insecticida no sistémico pertenece al grupo de la oxidiazina, el cual bloquea los canales de sodio.

#### 4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	-	3	0.01
Pimiento	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	-	3	0.3
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.3	7	0.02

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

**Presentaciones comerciales:** Frasco x 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 0.3 L, 0.15 L, Galonera x 4 L, Bidón x 20 L y Cilindro x 200 L.

#### 5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

**INDOXACROP 150 SC**, realizar la aplicación foliar dirigida al follaje con cualquier equipo de aplicación terrestre. Puede ser aplicada con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc. Aspersión foliar según los periodos de aparición de la plaga. Utilizar un buen volumen de agua a fin de cubrir bien todo la planta.

**INDOXACROP 150 SC** el momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega el **INDOXACROP 150 SC**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

#### 6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

#### 7. COMPATIBILIDAD

**INDOXACROP 150 SC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

#### 8. FITOTOXICIDAD

**INDOXACROP 150 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

## 9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

**Toxicidad aguda/estudios de irritación:**

**Oral aguda, rata DL50:** > 2500 mg/kg b.w.

**Dermal aguda, rata DL50:** > 5000 mg/kg;

**Inhalatoria aguda, rata CL 50:** > 2.7 mg/l;

**Ojos:** No irritante en conejos

**Piel:** No irritante en conejos

**Sensibilización:** Ligeramente sensibilizante cutáneo en cobayos

**Categoría Toxicológica:** III. Ligeramente peligroso – Cuidado

## 10. PRECAUCIONES DE USO

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

**CICOTOX:** 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

**ESSALUD:** 117 (gratuito)

**CISPROQUIM** 0800-5-0847