

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida de amplio espectro de acción utilizado en el control de ácaros fitopatógenos en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración: Spirodiclofen 250 g/l + Fenpyroximate 125 g/l

Grupo Químico: Acido tetrónico (Spirodiclofen), Pyrazole (Fenpyroximate)

Clase de Uso: Acaricida

Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)

Registro PQUA N°: 2252– SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.

1904, Central International Mansion 105-6 North Zhongshan Road, Nanjing, China

Teléfono: + 86-25-66605701

Fax: +86-25-86558673

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina – Lima

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido blanco a amarillo

Densidad: 1.1 +/- 0.05 g/ml

pH: 5.0-9.0

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. MODO DE ACCIÓN

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión que combina la acción de dos ingredientes activos:

-Spirodiclofen: actúa como inhibidor de la síntesis de ácidos grasos (lípidos) afectando el desarrollo de los ácaros y;

-Fenpyroximate: actúa inhibiendo el transporte de electrones en el complejo mitocondrial.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L		
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.4* 0.5**
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocophtruta oleivora</i>	0.06 – 0.08	14	0.2* 2.0**
Palto	Acaro	<i>Olygonichus punicae</i>	0.06	2	1* 0.2**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos *Spirocliflofen; **Fenpyroximate
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Envases x 250 ml, x 500 ml, 1 L, Galón x 4 L, Bidón x 20 L y Cil 200 L.

5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia.

Se recomienda realizar como máximo hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SPIROCROP DUO 375 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

SPRIDOCROP DUO 375 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

9. PRECAUCIONES DE USO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersion.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicacion.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicacion y para ingresar al area tratada en las primeras 24 horas despues de la aplicacion.
- Despues de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y baneese con abundante agua y jabon.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas deber utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicacion siguiendo la direccion del viento.

10. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicacion llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico.

En caso de emergencia llame al siguiente numero:

ESSALUD: 0801-10200

CISPROQUIM 0800-050-847

SAMU : 106

