

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida sistémico, de contacto y con actividad translaminar, es utilizado en el control de diversos hongos fitopatógenos en un amplio rango de cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración: Iprodione 400 g/kg + Myclobutanil 100 g/Kg

Grupo Químico: Dicarboximide (Iprodione)
Triazole (Myclobutanil)

Clase de Uso: Fungicida

Tipo de formulación: Polvo Mojable (WP)

Registro PQUA N°: 2253– SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD

No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road Songjiang District, Shanghai
CHINA

Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 – Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina – Lima

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Polvo solido

Color: Blanco a gris

Densidad: 1.10 +/- 0.05 g/ml

pH: 4.0 - 6.5

Inflamabilidad: No Inflamable

Explosividad: No Explosivo

Corrosividad: No corrosivo

3. MODO DE ACCIÓN

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida que contiene en su formulación dos ingredientes activos: Iprodione fungicida que impide la colonización, avance y esporulación de los hongos y Myclobutanil, actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosteroles de los hongos o sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios entre el medio ambiente y el interior del hongo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

| Cultivo | Plaga | | Dosis | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|----------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | Kg/200L | | |
| Vid | Oidiosis | <i>Uncinula necator</i> | 0.3 | 14 | 1.0 |
| | Pudrición gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.3 – 0.4 | 14 | 1.0 |
| Cebolla | Pudrición gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.4 | 19 | 0.2* 0.06** |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Bolsa x 0.25 Kg, 0.5 Kg, 1 Kg, 10 Kg y 25 Kg

5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRIMIX DUO 500 WP** de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 10 a 14 días.

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado durante las primeras 24 horas después del tratamiento.

7. COMPATIBILIDAD

BOTRIMIX DUO 500 WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

8. FITOTOXICIDAD

BOTRIMIX DUO 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Toxicidad oral aguda, LD50 2150 mg/kg;

Dermal aguda, LD50 5526.6 mg/kg;

Inhalatoria aguda, LC 50 (4h) > 5.2 mg/l;

Piel: No irritante

Ojos: No irritante

Sensibilización: No sensibilizante

Categoría Toxicológica: III. Ligeramente Peligroso - Cuidado

10. PRECAUCIONES DE USO

El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Evite el contacto con la piel y la ropa.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

CISPROQUIM: 0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)

