

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIPROKILL 200 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión en los insectos.

FIPROKILL 200 SC presenta un buen efecto residual después de su aplicación permitiendo un efectivo control de las plagas.

Ingrediente Activo/Concentración: Fipronil 200 g/L

Grupo Químico: Fenilpirazoles

Clase de Uso: Insecticida

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Registro PQUA N°: 776 – SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD.

No.26 Majia street, Nanjing Jiangsu, 210009 – CHINA

Teléfono/Fax: 0086 25 83303203



Importado y distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo N° 580 Dpto301 Urb. Santa Patricia I Etapa – La Molina

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Suspensión líquida blanco a crema con ligero olor

Densidad: 1.05±0.05 g/ml at 20°C


pH: 5.0 – 7.0

Persistencia de espuma: Máximo 30 ml después de 1 minuto

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo



3. MODO DE ACCIÓN

FIPROKILL 200 SC es un insecticida de aplicación foliar, utilizado para el control de diferentes plagas en diversos cultivos. Tiene acción sistémica en la planta. En los insectos actúa por contacto e ingestión.

FIPROKILL 200 SC actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, causando hiperexcitabilidad y convulsiones en el insecto.

4. RECOMENDACIONES DE USO

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea las dosis indicadas:

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20	14	0.02
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	21	0.01
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.25	14	0.01
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.20 - 0.25	7	0.01

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Presentaciones comerciales: Frasco x 0.25 L, 0.5 L y 1 L, Galonera x 4 L y 5 L, Bidón x 20 L y Cilindro 200 L

5. MODO Y MOMENTO DE APLICACIÓN

FIPROKILL 200 SC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga- cultivo.

FIPROKILL 200 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total. Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de la plaga.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FIPROKILL 200 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

FIPROKILL 200 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. TOXICIDAD AGUDA EN MAMÍFEROS

Oral aguda, rata DL₅₀: 1127 mg/kg

Dermal aguda, rata DL₅₀: 2495 mg/kg

Inhalatoria aguda, rata CL₅₀: 1.07 mg/l;

Irritación ocular: Ligeramente irritante en conejos

Irritación dermal: No irritante en conejos

Sensibilización: No es un sensibilizante cutáneo en cobayos

Categoría Toxicológica: II. Moderadamente Peligroso – Dañino

10. PRECAUCIONES DE USO

Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398
0800-5-0847

ESSALUD: 117 (gratuito)

CISPROQUIM