

BATISTA

Fluopicolide 62.5% + Propamacarb 62.5% SC

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BATISTA es un fungicida de acción sistémica y translaminar.

Ingrediente Activo/Concentración	: Fluopicolide 625 g/L + Propamacarb 625 g/L
Grupo Químico	: Benzamide (Fluopicolide), Carbamates (Propamacarb)
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
FRAC No.	: Grupo 43
	: Grupo 28
Registro PQUA N°	: 3655 – SENASA

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanquecino
Olor	: Penetrante
Densidad	: 1.1302 g/ml a 20 °C
pH	: 4 - 8
Punto de inflamación	: No inflamable.
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

BATISTA es un fungicida que contiene dos ingredientes activos: Fluopicolide y Propamacarb HCl.

Fluopicolide presenta actividad antiesporulante y acción específica contra pseudohongos Oomycetos. Propamacarb HCl influye en el metabolismo del Oomyceto y actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.6 – 0.8*	14	0.2 ¹ 0.3 ²

PC: Período de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

¹Fluopicolide

²Propamacarb

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BATISTA** durante el desarrollo vegetativo del cultivo de papa, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

Para la preparación de la mezcla del producto **BATISTA**, llene el cilindro de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. **BATISTA** se aplica empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor.

BATISTA

Fluopícolide 62.5% + Propamacarb 62.5% SC

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

BATISTA es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de CROP BUSINESS SAC.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Botella	0.25 L, 0.5 L, 1L
Bidon	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.