

# BLUESTAR

Thiabendazole 500 g/L SC

## 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**BLUESTAR** es un fungicida sistémico.

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ingrediente Activo/Concentración | : Thiabendazole 500 g/L       |
| Grupo Químico                    | : Benzimidazoles              |
| Clase de Uso                     | : Fungicida                   |
| Tipo de formulación              | : Suspensión Concentrada (SC) |
| FRAC No.                         | : Grupo 1                     |
| Registro PQUA Nº                 | : 4261 – SENASA               |

## 2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Aspecto físico       | : Líquido blanco             |
| Olor                 | : Característico de solvente |
| Densidad             | : 1.168 g/ml a 20 °C         |
| pH                   | : 6.58                       |
| Punto de inflamación | : No inflamable.             |
| Explosividad         | : No explosivo               |
| Corrosividad         | : No corrosivo               |
| Viscosidad           | : 650.26 mPas                |

## 3. MODO Y SITIO DE ACCION

**BLUESTAR** es un fungicida del grupo de los benzimidazoles. Es sistémico, protector y curativo. Actúa inhibiendo la mitosis y la meiosis, afectando el crecimiento y desarrollo del hongo.

## 4. RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo | Plaga            |                                 | Dosis  |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|------------------|---------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
|         | Nombre Común     | Nombre Técnico                  | L/200L | L/Ha |           |           |
| Palto   | Muerte regresiva | <i>Lasiodiplodia theonromae</i> | 0.15   | 0.9  | 15        | 15        |

PC: Periodo de Carencia      LMR: Límite máximo de residuos  
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

## 5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BLUESTAR** durante el desarrollo vegetativo del cultivo de palto. Cuando la enfermedad se encuentre presente y, de preferencia, en sus inicios. Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo con la dosis recomendada y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

## 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

# BLUESTAR

Thiabendazole 500 g/L SC

## 7. COMPATIBILIDAD

**BLUESTAR** puede ser empleado en mezclas con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Evitar mezclar con productos cáusticos, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba antes de mezclar con otro producto.

## 8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## 9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de CROP BUSINESS SAC.

## 10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 0.25 L, 0.5 L y 1 L  
Bidon 20 L  
Cilindros 200 L.

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.