

# BOTRYKILL 500 WP®

Iprodione 50%

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida está orientado a proteger órganos sensibles como flores y frutos, ayudando a preservar la sanidad y calidad del cultivo durante etapas críticas de desarrollo.

Ingrediente Activo/Concentración	: Iprodione 500 g/kg
Grupo Químico	: Dicarboximide
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No. FRAC	: 2
Registro PQUA N°	: 2450- SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

## 2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo inholoro
Color	: Blanco a gris
Densidad	: 1.2 +/- 0.2g/ml
pH	: 4.0 - 6.0
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

## 3. MODO Y SITIO DE ACCION

**BOTRYKILL 500 WP** es un fungicida de amplio espectro, de acción de contacto que actúa sobre las esporas y el micelio de los hongos, lo cual provee un excelente control sobre los mismos.

Afecta diferentes fases del desarrollo del ciclo de los hongos: el crecimiento de esporas, el crecimiento de micelio y la reproducción de esporas.

## 4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L		
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	7	0.2
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	3	7.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

## 5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El momento oportuno de aplicación de **BOTRYKILL 500 WP** es recomendable hacer aplicaciones tempranas previas a la evaluación a inicios de la incidencia de la enfermedad, para evitar daños económicos importantes en el cultivo.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo de 7 a 14 días.

# BOTRYKILL 500 WP <sup>®</sup>

*Iprodione 50%*

## 6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado durante las primeras 12 horas después del tratamiento.

## 7. COMPATIBILIDAD

**BOTRYKILL 500 WP** es compatible con la mayoría de pesticidas o fertilizantes de uso agrícola excepto con aquellos agentes fuertemente alcalinos, ácidos u oxidante fuerte. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a su uso.

## 8. FITOTOXICIDAD

**BOTRYKILL 500 WP** no es fitotóxico si es aplicado a los cultivos recomendados si se sigue las instrucciones indicadas en la etiqueta.

## 9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

## 10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.20 Kg, 0.25 Kg, 0.5 Kg, 1 Kg.

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.