

CICLOPE 500 WP®

Fenhexamid 50%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CICLOPE 500 WP está desarrollado para el manejo específico de enfermedades fúngicas que afectan órganos aéreos del cultivo. El producto está orientado a aplicaciones preventivas, contribuyendo a proteger tejidos sensibles y a reducir el desarrollo de infecciones bajo condiciones favorables para la enfermedad.

Ingrediente Activo/Concentración	: Fenhexamid 500 g/Kg
Grupo Químico	: Hidroxianilidas
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo mojable (WP)
FRAC No.	: 17
Registro PQUA N°	: 1499 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo solido de color marrón claro con olor característico débil
Densidad	: 1.23 g/ml
Persistencia de espuma	: Max 25 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

CICLOPE 500 WP actúa principalmente por contacto, con acción preventiva, ejerciendo su efecto sobre los tejidos tratados. Previene que los hongos infecten a las plantas inhibiendo la germinación de las esporas, crecimiento del tubo germinativo y crecimiento del micelio. Impidiendo la penetración del hongo en los tejidos de la planta ocasionando finalmente su muerte.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5	7	5
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75	3	0.05
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5-0.75	0	10

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

CICLOPE 500 WP®

Fenhexamid 50%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CICLOPE 500 WP debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Aplicar **CÍCLOPE 500 WP** (i.a. Fenhexamid) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año para los cultivos de vid y alcachofa. Considerar una frecuencia de hasta 14 días entre aplicación.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 12 horas del tratamiento o aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CICLOPE 500 WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

8. FITOTOXICIDAD

CÍCLOPE 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 1 Kg y 25 Kg.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.