

CYMONEB 78 PM®

Propineb 70% + Cymoxanil 8%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CYMONEB 78 PM es un fungicida de amplio espectro indicado para el control de en diversos cultivos agrícolas. Su formulación contribuye a una protección eficaz del cultivo, ayudando a mantener la sanidad del follaje y otros órganos vegetales bajo condiciones favorables para el desarrollo de patógenos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Propineb 700 g/kg + Cymoxanil 80 g/Kg
Grupo Químico	: Ditiocarbamate (Propineb) Cyanoacetamide-oxime (Cymoxanil)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No. FRAC	: M03 (Propineb), 27 (Cymoxanil)
Registro PQUA N°	: 1606– SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo blanco a crema con leve olor característico
Densidad	: 0.3 - 0.4
pH	: 4.0 – 8.0
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

CYMONEB 78 PM es un fungicida de contacto y traslaminar de acción protectante y curativa.

CYMONEB 78 PM es una mezcla de dos fungicidas: Propineb y Cymoxanil

Propineb actúa principalmente interfiriendo en diferentes ubicaciones en el metabolismo de los hongos. Este modo de múltiples sitios de acción impide el desarrollo de resistencia lo que es complementada con el efecto de Cymoxanil, que actúa inhibiendo el crecimiento del patógeno en las hojas tratadas, dañadas e impide el desarrollo de los haustorios e inicia las respuestas, como la decoloración de las células infectadas y el colapso de las células adyacentes, para confinar al patógeno para el sitio inicial de la infección.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L		
Papa	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.3* 0.05**
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.4-0.5	7	0.05* 0.05**
Tomate	Hielo o Ranca	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4-0.5	7	3.0* 0.2**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino)

CYMONEB 78 PM®

Propineb 70% + Cymoxanil 8%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

El momento oportuno de su aplicación de **CYMONEB 78 PM** será cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Para el cultivo de papa considerar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año. Para los cultivos de cebolla y tomate, considerar máximo una (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CYMONEB 78 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

CYMONEB 78 PM no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.5 Kg, 1 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.