

FITOZEB 80 PM®

Mancozeb 80%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FITOZEB 80 PM es un fungicida que actúa por contacto sobre las hojas, para el control preventivo de diversos patógenos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Mancozeb 800 g/kg
Grupo Químico	: Ditiocarbamato
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No FRAC	: M03
Registro PQUA N°	: 984 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo sólido amarillo grisáceo de olor a humedad
Densidad	: 0.6-0.7 g/ml a 20 °C
pH	: 5.0 – 8.0 (solución acuosa 1%)
Persistencia de espuma	: Máximo 25 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: Inflamable
Explosividad	: Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

FITOZEB 80 PM es un fungicida preventivo de contacto con amplio espectro de acción sobre diversos hongos. **FITOZEB 80 PM** tiene acción multi-sitio en los diversos patógenos, induce la inhibición enzimática múltiple, inhibe la respiración, inactiva grupos sulfhídricos (-SH), desnaturaliza enzimas, afecta el ciclo de Krebs, impide la formación de ATP, afecta lípidos de la membrana.

FITOZEB 80 PM impide la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo del patógeno sobre la superficie de la hoja, impidiendo su colonización.

Su ingrediente activo Mancozeb, es clasificado por FRAC como un fungicida Ditiocarbamato, Multi-sitio, con riesgo de resistencia muy bajo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.75	1.5	28	0.1
Tomate	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.5	1.5	5	2.0
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	0.75 - 1.0	1.5 - 2.0	7	1.0
Papa	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5-1.0	1.0 - 2.0	7	0.3
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6	-	40-60	5

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

FITOZEB 80 PM[®]

Mancozeb 80%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **FITOZEB 80 PM** cuando las condiciones favorezcan la aparición del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Las aplicaciones de **FITOZEB 80 PM** debe ser realizado dirigido al follaje, procurando mojar uniformemente para asegurar un buen control del patógeno.

En el cultivo de papa utilizar la menor dosis cuando las condiciones climáticas y estado fenológico de la planta son favorables para el desarrollo de la enfermedad y utilizar la mayor dosis cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña/año. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FITOZEB 80 PM es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Incompatible con productos fuertemente alcalinos, ácidos u oxidantes fuertes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 1 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.