

FITOZIM 500 SC®

Carbendazim 50%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FITOZIM 500 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro, contribuye a la protección de la sanidad vegetal, ayudando a mantener el desarrollo normal del cultivo bajo condiciones favorables para la presencia de patógenos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Carbendazim 500 g/L
Grupo Químico	: Benzimidazol
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
No FRAC	: 1
Registro PQUA N°	: 944 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanquecino de olor característico
Densidad	: 1.13-1.18 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0 – 9.0
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo
Estabilidad de la emulsión	: No aplicable

3. MODO Y SITIO DE ACCION

FITOZIM 500 SC es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, de rápida acción.

FITOZIM 500 SC impide el desarrollo de las hifas, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio. Detiene el desarrollo del tubo germinativo provocando irregularidades en la división celular y dando lugar a células anormales que provocan la muerte del hongo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Arroz	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	-	0.5	8	0.01
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	1.5	14	0.7
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3-0.5	0.6-1.0	7	0.5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	14	0.3

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

FITOZIM 500 SC®

Carbendazim 50%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

FITOZIM 500 SC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Utilizar un buen volumen de agua para la aplicación de **FITOZIM 500 SC**, a fin de cubrir toda la planta.

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FITOZIM 500 SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

FITOZIM 500 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 0.25 L, 0.5 L, 1 L

Galonera 4 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.