

KAYZER®

Mancozeb 60% + Dimethomorph 9%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KAYZER es un fungicida indicado para el control de enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas. La formulación está orientada a brindar una protección eficaz del cultivo, contribuyendo a mantener la sanidad del follaje y otros órganos vegetales, incluso bajo condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Ingrediente Activo/Concentración	: Mancozeb 600 g/Kg + Dimetomorph 90 g/Kg
Grupo Químico	: Ditiocarbamato + Morpholinas
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo mojable (WP)
No. FRAC	: Mancozeb (M03), Dimetomorph (40)
Registro PQUA N°	: 1265 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo sólido, blanco amarillento de olor característico
Densidad	: 1.12 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0-8.0 (solución acuosa 1%)
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

KAYZER es un fungicida sistémico y de contacto, de amplio espectro, que posee acción preventiva y curativa sobre una amplia variedad de hongos fitopatógenos.

KAYZER es un fungicida que contiene 2 ingredientes activos en su formulación:

- Mancozeb es un fungicida protector que amplía el espectro de acción sobre diversos hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción multisítica actúa en diferentes sitios de acción en los hongos que controla.
- Dimethomorph presenta acción curativa, sistemicidad local, efecto antiesporulante y actúa alterando la formación de la pared celular en todos los estados del ciclo de vida del hongo, excepto en la formación de zoosporas.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	-	14	0.5* 0.15**
Papa	"Rancha" o "Hielo"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0	-	7	0.2* 0.05**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	.	1.5	66	5* 3**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos ppm = partes por millón

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Mancozeb* Dimetomorph**

KAYZER®

Mancozeb 60% + Dimethomorph 9%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **KAYZER** cuando las condiciones favorezcan el desarrollo del patógeno (preventivo) o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad (curativo).

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

KAYZER es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

KAYZER no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 1 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.