

LUXOR TOP®

Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

LUXOR TOP es un fungicida indicado para el control de enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas. Su formulación contribuye a una protección eficaz del cultivo, ayudando a mantener la sanidad del follaje y otros órganos vegetales bajo condiciones favorables al desarrollo de patógenos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Azoxystrobin 200 g/L + Difenoconazole 125 g/L
Grupo Químico	: Azoxystrobin: Estrobilurina Difenoconazole: Triazol
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
No. De FRAC	: Azoxystrobin (11), Difenoconazole (3)
Registro PQUA Nº	: 913 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo pálido opaco sin olor
Densidad	: 1.10 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0 – 8.0
Punto de inflamación	: >60 °C
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo
Estabilidad de la emulsión	: No aplicable

3. MODO Y SITIO DE ACCION

LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado en el control de hongos fitopatógenos en diversos cultivos.

LUXOR TOP tiene acción preventiva, curativa y antiesporulante.

LUXOR TOP contiene dos ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción: El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, dicho compuesto da fluidez e integridad a la membrana, permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a ella; el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1.

LUXOR TOP®

Azoxystrobin 20% + Difenconazole 12.5%

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1.0* 0.02**
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	10* 0.05**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0* 0.05**
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	21	2.0* 3.0**
Espárrago	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	0.2	-	100	0.01* 0.05**
Arándano	Cabeza de Clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5	1	5.0* 0.1**
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	-	3	3.0* 0.8**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

* Azoxystrobin

**Difenconazole

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción enfermedad – cultivo.

En los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

En el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.

El momento oportuno de aplicación es a inicios de la infestación de la enfermedad en las plantas del campo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de la enfermedad.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

LUXOR TOP es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

LUXOR TOP no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

LUXOR TOP®

Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5%

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L, 0.5 L y 1 L.

Galón 4 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.