

NOVA®

Tricyclazole 75%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

es un fungicida protectante que controla enfermedades mediante la prevención de la entrada de patógenos a la planta de arroz.

Ingrediente Activo/Concentración	: Tricyclazole 750 g/Kg
Grupo Químico	: Benzotiazoles
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No. FRAC	: 16.1
Registro PQUA N°	: 1902 – SENASA
Titular del Registro	: ALBAUGH PERU S.A

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Solido
Color	: Rojo
Olor	: Característico
pH	: 6.16
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

Mecanismo de acción. El tricyclazole es un inhibidor de la biosíntesis de melanina que es esencial para la penetración e infección en hongos fitopatógenos que forman apresorios. En la biosíntesis de la melanina, el tricyclazole inhibe la enzima reductasa del 1,3,8-trihydroxynaphthaleno a vermelone, el cual es un precursor de la melanina.

Modo de acción. El tricyclazole es un fungicida sistémico que se absorbe rápidamente por raíces y follaje y se trasloca por la xilema y el apoplasto ascendentemente. El tricyclazole se usa para el control de Pyricularia en arroz trasplantado o sembrado, puede aplicarse en drench, como inmersión de raíces al trasplante o como aplicación foliar.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia Oryzae</i>	0.25	30	1

PC – Periodo de carencia o tiempo entre la última aplicación y cosecha.

LMR – Límite máximo de residuo en partes por millón – ppm.

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación por campaña año al inicio de los síntomas en el cultivo.

Volumen de aplicación. Se recomienda usar equipos de aplicación en buen estado operando a parámetros conocidos y presión regulada que permitan realizar control de la dosis real aplicada garantizando óptima cobertura y penetración de gotas.

NOVA®

Tricyclazole 75%

6. PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de las 12 horas de aplicado el producto.

7. COMPATIBILIDAD

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso y aplicación dadas por el fabricante. No mezclar con químicos altamente reactivos como ácidos o bases fuertes o agentes oxidantes fuertes. En caso de mezcla con productos en la que no se conozca su selectividad al cultivo y/o compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo responsabilidad del usuario realizar una prueba a pequeña escala, antes de la aplicación comercial.

8. FITOTOXICIDAD

NOVA no es fitotóxico para el cultivo recomendado en esta etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.25 Kg, 0.50 Kg, 1 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.