

RANCHACROP®

Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

RANCHACROP es un fungicida indicado para el control de enfermedades fúngicas en diversos cultivos.

La combinación de sus ingredientes activos permite un control confiable y sostenido, siendo especialmente adecuado para programas de manejo de enfermedades bajo condiciones favorables para el desarrollo del patógeno.

Ingrediente Activo/Concentración	: Mancozeb 640 g/kg + Metalaxyl 80 g/Kg
Grupo Químico	: Ditiocarbamato (Mancozeb) Phenilamida (Metalaxyl)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
FRAC No.	: Mancozeb (M03), Metalaxyl (4)
Registro PQUA Nº	: 2843— SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Polvo solido
Densidad	: 0.55 ± 0.05 g/ml
pH	: 6.9
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No Explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

RANCHACROP es un fungicida sistémico de amplio espectro, con actividad protectora y curativa, se recomienda la aplicación tempranamente para evitar la acumulación de la enfermedad.

RANCHACROP es una mezcla de dos fungicidas de diferentes modos de acción:

Metalaxyl es del grupo de las fenilamidas, se absorben rápidamente en el tejido de la planta y son trasladadas acropetalmente dentro de la planta.

Mancozeb pertenece al grupo de los ditiocarbamatos y actúa por contacto sobre los hongos fitopatógenos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/Ha	Kg/200L		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.8 - 1	45	0.5* 0.2**
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	2	-	15	3.0* 2.5**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara vitícola</i>	2	-	66	2.0* 1.5**

PC: Periodo de Carencia

*Metalaxyl **Mancozeb

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

RANCHACROP®

Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

En vid realizar una aplicación por campaña/año

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

RANCHACROP Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

8. FITOTOXICIDAD

RANCHACROP no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 1 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descrita en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.