

SADDLER 350 SC

Thiodicarb 350 g/L

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SADDLER 350 SC es un insecticida usado en el control de lepidopteros en diversos cultivos agrícolas.

Ingrediente Activo/Concentración	: Thiodicarb 350 g/L
Grupo Químico	: Carbamato
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
IRAC No.	: 1A
Registro PQUA Nº	: 3886 – SENASA

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido viscoso de color malva
Olor	: Desagradable
Densidad	: 1.124 g/ml a 20 °C
pH	: 5.5
Punto de inflamación	: > 500 °C
Punto de inflamación	: No inflamable.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

SADDLER 350 SC es un insecticida a base de thiodicarb el cual actúa por ingestión y menor acción por contacto. Es un insecticida de amplio espectro y se usa en el control de plagas insectiles y foliares. Es larvicida y su control dura por dos semanas.

Thiodicarb inhibe la enzima acetilcolinesterasa (AChE), interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos en el insecto, lo que eventualmente termina en su muerte.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Plaga		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Tomate	Caballada o Gusano ejército	<i>Spodoptera eridanea</i>	-	0.5	14	0.01
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	0.6	7	2.00

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **SADDLER 350 SC** en los cultivos de tomate y maíz, una (01) aplicación como máximo cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la plaga, considerando dos (02) campañas por año.

SADDLER 350 SC

Thiodicarb 350 g/L

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SADDLER 350 SC puede mezclarse con la mayoría de los agroquímicos existentes en el mercado, sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de su uso. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de CROP BUSINESS SAC.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Botella	0.25 L, 0.5 L, 1L
Galonera	4L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.