

SCREEN 625 WG®

Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SCREEN 625 WG es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos que complementan efectivamente su acción en el control de Botrytis en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Cyprodinil 375 g/kg + Fludioxonil 250 g/kg
Grupo Químico	: Anilinopyrimidine (Cyprodinil) Phenylpyrrole (Fludioxonil)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Gránulo Dispersable (WG)
FRAC No.	: Cyprodinil (9), Fludioxonil (12)
Registro PQUA N°	: 2207 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Sólido granulado gris claro sin olor
Densidad	: 0.56 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0 – 9.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

SCREEN 625 WG es un fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa eficaz en el control de Botrytis cinerea.

SCREEN 625 WG es un fungicida compuesto por:

Cyprodinil, que inhibe la penetración y crecimiento del micelio dentro del tejido de la planta.

Fludioxonil, que inhibe la germinación de esporas, desarrollo del tubo germinativo y crecimiento micelial del hongo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8-1.0	7	1.5* 1.0**
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	1	3.0* 2.0**
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8-1.0	7	3.0* 5.0**

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

Cyprodinil*, Fludioxonil**

SCREEN 625 WG ®

Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de su aplicación de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda hasta 3 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicación de 10-14 días.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SCREEN 625 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

SCREEN 625 WG no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas 0.1 Kg, 0.2 Kg, 0.5 Kg, 10 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.