

SUPER ONE 400 EC [®]

Isoprothiolane 40%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SUPER ONE 400 EC es un fungicida sistémico. El producto es absorbido por la planta y distribuido en los tejidos tratados, que proporciona un control eficaz de enfermedades fúngicas, especialmente aquellas que afectan al follaje y a los órganos verdes.

Ingrediente Activo/Concentración	: Isoprothiolane 400 g/L
Grupo Químico	: Phosphorothiolate
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
FRAC No.	: 6
Registro PQUA N°	: 832 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido anaranjado amarillento de olor característico
Densidad	: 1.0-1.05 g/ml a 20 °C
pH	: 5.0-6.0
Persistencia de espuma	: Máximo 20 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

SUPER ONE 400 EC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa. Se absorbe por las hojas y raíces, y presenta translocación acropétalo y basipétalo.

SUPER ONE 400 EC Inhibe el proceso de penetración del hongo (efecto preventivo) y detiene el crecimiento de las hifas infectivas que forman el micelio y la germinación de las conidias (efecto curativo)

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Arroz	Quemador del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.5	0.5	28	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5	1.0	14	0.01

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino).

SUPER ONE 400 EC [®]

Isoprothiolane 40%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

SUPER ONE 400 EC debe ser aplicado cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad (preventivo) o tan pronto como se observen los primeros síntomas (curativo).

SUPER ONE 400 EC debe repetir la aplicación a intervalos de 7 a 14 días. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SUPER ONE 400 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

SUPER ONE 400 EC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.5 L ,1 L

Galón 4 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.