

SUPRAZOLE 200 EW®

Penconazole 20%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SUPRAZOLE 200 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles, está orientado a aplicaciones preventivas y curativas tempranas, contribuyendo a la protección del cultivo y a la estabilidad de su desarrollo vegetativo.

Ingrediente Activo/Concentración	: Penconazole 200 g/L
Grupo Químico	: Triazole
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Emulsión aceite en agua (EW)
No. FRAC	: 3
Registro PQUA N°	: 2383 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Blanco
Olor	: Olor aromático
Densidad	: 1.05 +/- 0.07 g/ml
pH	: 4 – 8 (solución al 1%)
Persistencia de espuma	: Máximo 50 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

SUPRAZOLE 200 EW es un fungicida de acción sistémica, que se absorbe por el follaje y se transloca dentro de la planta.

Actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, componente esencial de la membrana celular fúngica, lo que impide el crecimiento del micelio y la esporulación. Presenta acción preventiva y curativa temprana, siendo eficaz en el control de enfermedades que afectan los tejidos aéreos del cultivo.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	L/200 L	L/ Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.075	0.15	30	0.2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.05 – 0.06	0.25-0.3	30	0.2

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

SUPRAZOLE 200 EW®

Penconazole 20%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, mediante aplicaciones preventivas cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar como máximo hasta 3 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 20 días.

Dosis máxima de aplicación: Pimiento: 0.15 L/Ha. Vid: 0.3 L/Ha.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

7. COMPATIBILIDAD

SUPRAZOLE 200 EW es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

8. FITOTOXICIDAD

SUPRAZOLE 200 EW no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.1 L, 0.25 L, 0.50 L, 1 L

Galonera 4 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.