

VISAGE®

Prochloraz 45% EC

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VISAGE es un fungicida de la familia de los imidazoles es sistémico translaminar de amplio espectro con acción preventiva, curativa y erradicante.

Ingrediente Activo/Concentración	: Prochloraz 450 g /L
Grupo Químico	: Imidazol
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
FRAC No.	: 3
Registro PQUA Nº	: 3190 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo claro a marrón
pH	: 5.0-8.0
Densidad	: 1.05 -1.10 g/ml a 20 °C
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

VISAGE es un fungicida sistémico traslaminar y contacto, protector y erradicante. Inhibe la síntesis de ergosterol. Posee una gran acción de penetración y sistemicidad es rápidamente absorbido por la planta; actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo, impidiendo finalmente la multiplicación del hongo.

VISAGE inhibe la germinación de las esporas, el crecimiento del micelio y la biosíntesis del ergosterol fungoso, también puede inhibir las quinasas, interfiriendo con las señales intracelulares que controlan las muchas funciones celulares de los hongos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/Ha	%		
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2	0.1	5	5

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite máximo de residuos

VISAGE®

Prochloraz 45% EC

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

VISAGE debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Hacer un máximo de 1 aplicación por campaña. Incidencia de la plaga (realizar monitoreos en campo frecuentes para determinar el grado de infestación en el cultivo).

Las aplicaciones de **VISAGE** deben ser realizado dirigido al follaje, procurando mojar uniformemente para asegurar un buen control de la plaga.

6. PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

VISAGE es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina y ácidos fuertes, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

8. FITOTOXICIDAD

VISAGE no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L, 0.5 L, 1 L

Galoneras 4 L, 5 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.