

BOSCOTT 210 SC®

Etoxazole 16.8% + Abamectin 4.2%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BOSCOTT 210 SC es un novedoso acaricida a base de Etoxazole y Abamectin.

Ingrediente Activo/Concentración	: Etoxazole 168 g/L. + Abamectina 42 g/L.
Grupo Químico	: Diphenyl oxazoline (Etoxazole), Avermectin (Abamectin)
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
IRAC No.	: 10B (Etoxazole), 6 (Abamectin)
Registro PQUA Nº	: 3327 – SENASA
Titular del Registro	: ALBAUGH PERU S.A.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido Blanquecino de olor característico ligero.
Densidad	: 1.06371
pH	: 8.06
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

BOSCOTT 210 SC es un acaricida a base de Etoxazole y Abamectin que actúa por contacto e ingestión. Etoxazole inhibe el proceso de muda del juvenil y también presenta una actividad ovicida al reducir la viabilidad de los huevos y la fecundidad de las hembras adultas mientras que Abamectin inhibe la transmisión de señales nerviosas. La plaga queda inmovilizada poco después de ingerir el producto, detiene su alimentación sobre el cultivo, y muere a los 3 o 4 días. Abamectin penetra el tejido foliar formando una reserva en su interior, que proporciona una actividad residual.

Aplicar **BOSCOTT 120 SC** con equipo de aspersión terrestre calibrado y dirigido al follaje. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis del producto, agitar y completar el volumen a aplicar.

4. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMUN	N. CIENTIFICO	L/200L	L/Ha		
Mandarina	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	0.06	-	14	0.1* 0.04**
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus yothersi</i>	-	0.2	14	0.2* 0.01**
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.08- 0.1	-	7	0.01* 0.03**
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.05	-	28	0.01* 0.01**
Limón	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.05	-	14	0.01* 0.01*

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos *Etoxazole **Abamectin
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino).

BOSCOTT 210 SC®

Etoxazole 16.8% + Abamectin 4.2%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda una sola aplicación de **BOSCOTT 210 SC** por campaña durante el desarrollo de hojas para los cultivos de mandarina, palto, vid, pimiento y limón.

Aplicar **BOSCOTT 210 SC** con equipo de aspersión terrestre calibrado y dirigido al follaje. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis del producto, agitar y completar el volumen a aplicar.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

No se conocen incompatibilidades. Se puede mezclar fácilmente con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos.

8. FITOTOXICIDAD

BOSCOTT 210 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos 1 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.