

BUTACROP 600 EC®

Butachlor 60%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BUTACROP 600 EC es un herbicida selectivo pre-emergente utilizado en el cultivo de arroz para el control de malezas gramíneas, ciperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha.

Ingrediente Activo/Concentración	: Butachlor 600 g/L
Grupo Químico	: Chloroacetanilide
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
HRAC No.	: Grupo K3 N
Registro PQUA Nº	: 1962 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Líquido violeta claro
Olor	: Leve olor aromático
pH	: 5.0-7.0
Densidad	: 1.10-1.15 g/ml
Punto de inflamación	: 45 °C. Inflamable
Corrosividad	: No corrosivo
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

BUTACROP 600 EC es un herbicida que tiene como ingrediente activo Butachlor de origen natural. es un herbicida selectivo para pre-emergencia y/o control de post-emergencia temprana de una variedad de hierbas indeseables y seleccionadas como las malezas de hoja ancha en arroz trasplantado y siembra directa.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plagas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	4.0	N.A	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			

PC: Periodo de Carencia (días) LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **BUTACROP 600 EC** en pre-emergencia de las malezas antes de siembra para un control general y antes de emergencia del cultivo después de siembra o trasplante.

Se recomienda hasta un máximo de 1 aplicación por campaña/2 por año.

BUTACROP 600 EC®

Butachlor 60%

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

BUTACROP 600 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

BUTACROP 600 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	1 L
Galonera	4 L, 5 L, 10 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.