

CIPERCROP 250 EC®

Cypermethrin 25%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CIPERCROP 250 EC es un insecticida de amplio espectro, actúa por contacto e ingestión.

Ingrediente Activo/Concentración	: Cypermethrin 250 g/L
Grupo Químico	: Piretroide
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (EC)
Nro. IRAC	: 3A
Registro PQUA Nº	: 1250–SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo pálido a ámbar
Olor	: Aromático
Densidad	: 0.90 - 0.98 g/ml a 20 °C
pH	: 4.0-8.0
Persistencia de espuma	: Máximo 60 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: >23 °C. Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

CIPERCROP 250 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión.

CIPERCROP 250 EC origina una excitación primaria del sistema nervioso periférico, que hace que el insecto agite sus miembros y alas. Absorbe a través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, tras lo cual estimula el sistema nervioso central, posiblemente por interferencia competitiva.

CIPERCROP 250 EC actúa como un toxico axónico interfiriendo con los canales de sodio del sistema nervioso periférico y central estimulando repetitivamente descargas nerviosas, llevando a la parálisis y muerte del insecto.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis L/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.25 - 0.3	21	0.05
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25 - 03	7	0.01
Esparrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.4

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

CIPERCROP 250 EC®

Cypermethrin 25%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CIPERCROP 250 EC debe ser aplicado previa evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.

El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5 % de infestación de la plaga en las plantas del campo. Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación con un intervalo de aplicación de 14 días.

CIPERCROP 250 EC no se debe aplicar en cultivos y plantas durante la floración, ya que es toxico para abejas.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación

7. COMPATIBILIDAD

CIPERCROP 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción alcalina, acida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

CIPERCROP 250 EC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L y 1 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.