

CROPFIRE 240 SC®

Chlorfenapyr 24%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CROPFIRE 240 SC es un insecticida adecuado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores y chupadores.

Ingrediente Activo/Concentración	: Clorfenapyr 240 g/l
Grupo Químico	: Pyrrole
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
IRAC No.	: 13
Registro PQUA N°	: 1296 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco a marrón claro, olor característico
Densidad	: 1.10-1.13 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0-8.0
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

CROPFIRE 240 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y tiene actividad translaminar. Es adecuado para el control de larvas y adultos de insectos masticadores, chupadores y masticadores de plaga.

CROPFIRE 240 SC es un desacoplador o inhibidor de la fosforilación oxidativa, impidiendo la formación de la molécula energética del trifosfato de adenosina.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L		
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	12	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.15 - 0.2	7	0.05

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

CROPFIRE 240 SC realizar la aplicación foliar dirigida al follaje con cualquier equipo de aplicación terrestre. Puede ser aplicada con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc. Aspersión foliar según los periodos de aparición de la plaga. Utilizar un buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.

CROPFIRE 240 SC®

Chlorfenapyr 24%

CROPFIRE 240 SC el momento oportuno de su aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega el **CROPFIRE 240 SC**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CROPFIRE 240 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

CROPFIRE 240 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L, 1 L
Galonera	4 L, 5 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.