

DOWN PLUS®

Imidacloprid 15% + Deltamethrin 4% OD

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DOWN PLUS es un insecticida de amplio espectro con acción sistémica, de contacto e ingestión. Controla insectos chupadores y masticadores en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Imidacloprid 150 g/L + Deltamethrin 40 g/L
Grupo Químico	: Neonicotinoide (Imidacloprid), Piretroide (Deltamethrin)
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Dispersión oleosa (OD)
Nro. IRAC	: 4A (Imidacloprid), 3A (Deltamethrin)
Registro PQUA Nº	: 1775 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido beige claro a marrón
Densidad	: 0.98 – 1.10 g/ml a 20 °C
pH	: 4.0 – 7.0
Persistencia de espuma	: Máximo 30 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

DOWN PLUS es un producto formulado a base de dos ingredientes activos que actúan de manera complementaria y sinérgica: Deltamethrin de acción de contacto e ingestión e Imidacloprid de acción sistémica, otorgando una acción rápida y efecto prolongado.

Deltamethrin actúa a nivel de los canales de sodio en la membrana nerviosa e Imidacloprid es un insecticida agonista de la acetilcolina, imita la acción del neurotransmisor llamado acetilcolina.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.3	21	0.05
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	0.8	21	0.05
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	1.0	7	0.2

PC: Periodo de Carenia LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar la aplicación foliar de **DOWN PLUS** dirigida al follaje con cualquier equipo de aplicación terrestre. Puede ser aplicado con mochila manual, mochila a motor, pulverizadores, bombas a motor, etc.

DOWN PLUS®

Imidacloprid 15% + Deltamethrin 4% OD

Iniciar el tratamiento con **DOWN PLUS** a inicios de la infestación de la plaga, para evitar daños económicos importantes en el cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, 2 campañas al año. Rotar diferentes productos entre aplicaciones.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

7. COMPATIBILIDAD

DOWN PLUS es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

DOWN PLUS no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L y 1 L
Cilindro	200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.