

FENUCROP 50 EC®

Lufenuron 5%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FENUCROP 50 EC es un insecticida usado en diversos cultivos para el control de diferentes artrópodos, especialmente lepidópteros y coleópteros.

Ingrediente Activo/Concentración	: Lufenuron 50 g/L
Grupo Químico	: Benzoylurea
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
IRAC No.	: 15
Registro PQUA Nº	: 722 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo de olor característico
Densidad	: 0.92 – 0.96 g/ml a 20 °C
pH	: 5.0 – 8.0 (solución acuosa 1%)
Inflamabilidad	: Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

FENUCROP 50 EC actúa por contacto e ingestión en larvas de insectos, inhibe su crecimiento ya que interfiere en la síntesis de quitina y esto evita que muden de un estadio a otro.

FENUCROP 50 EC también tiene efecto ovicida sobre ciertas plagas, además tiene efecto transovárico, es decir, que las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los ovarios y huevos, por tanto, los embriones no eclosionan.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.15-0.20	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	0.5	10	0.02
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Chloridea virescens</i>	-	0.6-0.7	7	1.0
Tomate	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15-0.2	-	7	0.5

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

FENUCROP 50 EC®

Lufenuron 5%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

FENUCROP 50 EC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Utilizar un buen volumen de agua para la aplicación de **FENUCROP 50 EC**, a fin de cubrir toda la planta.

Realizar hasta dos aplicaciones de **FENUCROP 50 EC** por campaña/cultivo.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FENUCROP 50 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

FENUCROP 50 EC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 1 L
Galonera	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.