

FULL AMINA 720 SL®

2,4 D dimetilamina sal 72% SL

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FULL-AMINA 720 SL es un herbicida hormonal sistémico selectivo post-emergente, utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes.

Ingrediente Activo/Concentración	: 2,4-D dimetilamina sal 720 g/L
Grupo Químico	: Fenólicos
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Concentrado Soluble (SL)
HRAC No.	: Grupo O
Registro PQUA Nº	: 702 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo pálido a marrón pálido de olor amina orgánica característica y fenólico
Densidad	: 1.15 – 1.25 g/ml a 20 °C
pH	: 7.0 – 10.0
Persistencia de espuma	: Máximo 20 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

FULL-AMINA 720 SL debido a su acción sistémica es absorbido rápidamente y es translocado hacia las partes apicales de la maleza de hoja ancha, esto provoca el incremento en la actividad metabólica alterándose la elaboración de las sustancias nutritivas y muere por autoconsumo de nutrientes.

FULL-AMINA 720 SL actúa estimulando la síntesis de los ácidos nucleicos y control de la síntesis de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la respiración y la división celular; inhibe el proceso fotosintético en las malezas de hoja ancha.

FULL-AMINA 720 SL actúa activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte. Las malezas muestran hipertrofia y deformación.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/200L	L/Ha		
Maíz	Verdolaga Yuyo Amor seco Capulí cimarrón Chamico	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus viridis</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i>	1.0	2.0	7	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FULL AMINA 720 SL®

2,4 D dimetilamina sal 72% SL

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones de **FULL-AMINA 720 SL** deben ser dirigidas al follaje de la maleza a controlar, haciendo una buena cobertura.

En maíz, la etapa apropiada para la aplicación de **FULL-AMINA 720 SL** es desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

FULL-AMINA 720 SL es compatible con los plaguicidas de uso frecuente, excepto con aquellos de reacción alcalina, ácidos u oxidantes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

FULL-AMINA 720 SL no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	1 L
Galonera	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.