

IMIDACROP 350 SC®

Imidacloprid 35%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

IMIDACROP 350 SC es un insecticida sistémico y translaminar en la planta. **IMIDACROP 350 SC** tiene amplio espectro para el control de insectos picadores, chupadores y masticadores, que atacan a diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Imidacloprid 350 g/L
Grupo Químico	: Neonicotinoide
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
IRAC No.	: 4A
Registro PQUA Nº	: 739 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco sin olor
Densidad	: 1.10 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0 – 7.5
Persistencia de espuma	: Menos de 25 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

IMIDACROP 350 SC tiene acción sistémica y translaminar en la planta.

IMIDACROP 350 SC actúa por contacto e ingestión interfiriendo la transmisión de los estímulos del sistema nervioso central de los insectos, obstruye los espacios sinápticos entre las terminaciones nerviosas ocasionando la acumulación de la acetilcolina lo que provoca la parálisis y muerte del insecto.

IMIDACROP 350 SC muestra también actividad antialimentaria paralizando la acción de alimentarse de los insectos. Esta acción evita inmediatamente la transmisión de virus y controla el daño producido por los insectos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	-	7	0.05
Papa	Caracha (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	-	14	0.5
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.2	0.5	7	0.5
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beekii</i>	0.14	-	30	1.0
Vid	Filoxera	<i>Viteus vitifoliae</i>	0.10-0.15	-	30	1.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

IMIDACROP 350 SC®

Imidacloprid 35%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

IMIDACROP 350 SC debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

IMIDACROP 350 SC se prepara diluyendo la dosis en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total. Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

IMIDACROP 350 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

IMIDACROP 350 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L y 1 L
Galonera	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.