

KANO®

Dinotefuran 50%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KANO es un insecticida neonicotinoide, tiene amplio espectro para el control de insectos picadores, chupadores y masticadores que atacan a diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Dinotefuran 500 g/Kg
Grupo Químico	: Neonicotinoids
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Gránulos Dispersables (WG)
IRAC No.	: 4A
Registro PQUA Nº	: 3131 – SENASA
Titular del Registro	: NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Importado y Distribuido por	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Blanquecino cilíndrico granulo
pH	: 5.0 – 9.0
Densidad	: 0.50 g/ml a 25 °C
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

KANO tiene acción sistémica y translaminar en la planta, cuya principal virtud es detener el daño por la picadura del insecto al momento de alimentarse, ocasionando la muerte en pocas horas.

KANO actúa por contacto e ingestión interfiriendo la transmisión de los estímulos del sistema nervioso central de los insectos, obstruye los espacios sinápticos entre las terminaciones nerviosas ocasionando la acumulación de la acetilcolina lo que provoca la parálisis y muerte del insecto.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis (Kg/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.20	21	0.01

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

KANO debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

KANO®

Dinotefuran 50%

Las aplicaciones de **KANO** deben ser realizado dirigido al follaje, procurando mojar uniformemente para asegurar un buen control de la plaga.

KANO se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

KANO es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

KANO no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.05 Kg, 0.1 Kg, 0.12Kg, 0.2 Kg, 0.25 Kg, 0.5Kg, 1Kg, 4Kg, 5Kg, 10Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.