

KRATTOS 240 SC®

Spiromesifen 22.86% + Abamectin 1.14%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

KRATTOS 240 SC es un insecticida-acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, utilizada en el control de insectos en los primeros estadios y también tiene actividad ovicida.

Ingrediente Activo/Concentración	: Spiromesifen 228.6 g/L + Abamectin 11.4 g/L
Grupo Químico	: Ácidos tetrónicos (Spiromesifen), Avermetins (Abamectin)
Clase de Uso	: Insecticida-Acaricida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
Nro. IRAC	: 23 (Spiromesifen), 6 (Abamectin)
Registro PQUA N°	: 1806 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido
Densidad	: 1.0 - 1.15 g/ml
pH	: 4.0 – 7.0
Inflamabilidad	: No Inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

KRATTOS 240 SC actúa por contacto e ingestión.

KRATTOS 240 SC inhibe la biosíntesis de los lípidos en los insectos, interrumpiendo su metabolismo, perdiendo la capacidad de crecer, mudar y ovipositar.

Abamectin basa en su acción específica sobre el ácido γ -aminobutírico (GABA), bloqueando así la transmisión de la señal nerviosa en las uniones neuromusculares, llevando a la parálisis y la muerte de los insectos. Spiromesifen inhibe la acetil coenzima A carboxilasa, parte del primer paso en la biosíntesis de los lípidos en ácaros.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/Ha	L/200 L		
Papa	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.6	-	14	*0.02 **0.01
Pimiento	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	0.6	-	21	*0.5 **0.05
Pimiento	“Acaro hialino”	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	0.25- 0.30	7	*0.5 **0.02

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

*Spiromesifen ** Abamectin

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

KRATTOS 240 SC®

Spiromesifen 22.86% + Abamectin 1.14%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar el tratamiento con **KRATTOS 240 SC** cuando la plaga se encuentre en el cultivo con un 5% de infestación. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con un intervalo de 7-10 días con otro grupo químico diferente dentro de un programa de manejo integrado. Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

KRATTOS 240 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

KRATTOS 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frascos	0.25 L, 0.5 L, 1 L
Galonera	4 L, 20 L
Bidon	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.