

MAIZINA 500 SC®

Atrazina 50%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAIZINA 500 SC es un herbicida sistémico selectivo post emergente utilizado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

Ingrediente Activo/Concentración	: Atrazina 500 g/L
Grupo Químico	: Triazinas
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
HRAC No.	: Grupo C1, C2
Registro PQUA N°	: 798 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco a marrón claro de olor característico
Densidad	: 1.05 – 1.10 g/ml a 20 °C
pH	: 6.0-9.0 (en solución acuosa al 1%)
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

MAIZINA 500 SC es un herbicida sistémico selectivo post emergente utilizado para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha en el cultivo de maíz.

MAIZINA 500 SC actúa tanto por vía radicular como foliar inhibiendo el proceso de la fotosíntesis, controlando la mayoría de las malezas anuales y eliminando las perennes.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Maíz	Verdolaga Yuyo Amor seco Lechera	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Euphorbia peplus</i>	1.5	7	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

MAIZINA 500 SC debe ser aplicado desde la emergencia hasta que el maíz tenga 20-25 cm de altura. Realizar una sola aplicación por campaña.

MAIZINA 500 SC®

Atrazina 50%

Aplicar **MAIZINA 500 SC** mediante pulverizaciones con cualquier equipo de aspersión terrestre, para lo cual se debe agregar al tanque de aspersión agua hasta la mitad y luego la dosis recomendada del producto, agitándolo continuamente con el volumen completo de agua, hasta que el producto este bien disuelto.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

MAIZINA 500 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Incompatible con productos fuertemente alcalinos, ácidos u oxidantes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

MAIZINA 500 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	1 L
Galonera	4 L
Bidon	20 L
Cilindro	200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.