

REGUM®

Clethodim 24% EC

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

REGUM, es un herbicida sistémico y selectivo, usado en el control post-emergente de malezas gramíneas.

Ingrediente Activo/Concentración	: Clethodim 240 g/L
Grupo Químico	: Ciclohexanodione
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Concentrado emulsionable (CE)
HRAC No.	: Grupo A
Registro PQUA Nº	: 3151 – SENASA
Titular del Registro	: NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.
Importado y distribuido por	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo claro
Densidad	: 0.97 – 1.10 g/ml a 20 °C
pH	: 4.0-7.0 (en solución acuosa al 1%)
Persistencia de espuma	: Máximo 25 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

REGUM es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente, que inhibe la síntesis de ácidos grasos, y que es recomendado contra malezas gramíneas anuales y perennes.

Los síntomas de control se observan entre 7 a 14 días después de la aplicación, dependiendo de la especie tratada y las condiciones ambientales.

Pueden persistir activos en el suelo causando efectos fitotóxicos a cultivos de gramíneas cuando son aplicados próximos a la siembra. Tener en cuenta que es inestable a pH y temperaturas extremas.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	1.0	15	1.7

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

REGUM se recomienda aplicar como máximo una vez por campaña, considerando una campaña por año.

Se recomienda aplicar cuando las malezas estén en crecimiento activo, bajo buenas condiciones de humedad y no pasan de 20-30 cm de altura. Hacer la aplicación cuando las malezas presenten de 2 a 4 hojas.

En periodos prolongados de sequía no se recomienda la aplicación de este producto. No aplicar si se espera lluvia una hora después de la aplicación.

REGUM®

Clethodim 24% EC

REGUM, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

Mantener una buena humedad de suelo durante y después de la aplicación.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

REGUM es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Incompatible con productos fuertemente alcalinos, ácidos u oxidantes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

REGUM no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L, 1 L
Bidón	4 L, 5 L, 10 L
Galonera	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.