

S-BRASSA®

Glyphosate 48% SL

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-BRASSA es un herbicida sistémico no selectivo, post emergente, absorbido por el follaje. Controla malezas anuales perennes y malezas de hoja ancho en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Glifosato isopropylamine sal 480 g/L
Grupo Químico	: Phosphonoglycine
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Concentrado Soluble (SL)
HRAC No.	: Grupo G
Registro PQUA N°	: 1069 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS SAC.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido amarillo claro a ámbar de leve olor característico.
Densidad	: 1.17 g/ml a 20 °C
pH	: 4.0-7.0
Persistencia de espuma	: Máximo 50 ml después de 1 minuto
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCION

S-BRASSA es un herbicida perteneciente al grupo de los Phosphonoglycine. Actúa interfiriendo con la síntesis de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano.

S-BRASSA se absorbe a través del follaje. Debido a este modo de acción, solo es eficaz en pleno crecimiento de las plantas y no es eficaz para impedir la germinación de semillas de las malezas.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Mandarina	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	3.0	6.0	1	0.5
	Capulí cimarrón	<i>Nycandra physalodes</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
Pimiento	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5-2.0	3.0-4.0	14	0.1
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>				

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

S-BRASSA®

Glyphosate 48% SL

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

S-BRASSA debe ser aplicado luego de la emergencia de las malezas, siempre y cuando se encuentren suficientemente expuestas al contacto con la solución del herbicida.

S-BRASSA en el cultivo de mandarina aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 1 campaña/año, aplicar sobre la zona de goteo entre e las calles. En el cultivo de pimiento aplicar máximo 1 aplicación/campaña; considerando 2 campañas/año, aplicar 3 días antes de la siembra o trasplante al campo definitivo.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

S-BRASSA es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

S-BRASSA no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	1 L
Galonera	4 L, 10 L
Bidon	20L
Cilindro	200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.