

SELLACROP 400 EC [®]

Pendimethalin 40%

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SELLACROP 400 EC es un herbicida selectivo utilizado para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en diversos cultivos. Actúa inhibiendo la división celular en los meristemos de tallos y raíces.

Ingrediente Activo/Concentración	: Pendimethalin 400 g/L
Grupo Químico	: Dinitroanilinas
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Concentrado Emulsionable (EC)
HRAC No.	: Grupo K1
Registro PQUA N°	: 1987 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Líquido amarillo a naranja
Olor	: Aromático
PH	: 5.5-8.5
Densidad	: 0.94-1.0 g/l
Punto de inflamación	: > 60 °C, no inflamable

3. MODO Y SITIO DE ACCION

SELLACROP 400 EC es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y las hojas. Se absorbe por las raíces en cantidades limitadas. Hay poca redistribución por translocación. La absorción por los brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja ancha, las plantas afectadas mueren rápidamente después de la germinación o a continuación de la emergencia.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plagas		Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.5	60	0.05
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
Cebolla	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>	1.0-1.5	30	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

SELLACROP 400 EC [®]

Pendimethalin 40%

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **SELLACROP 400 EC** en pre-emergencia y/o post-emergencia temprana de la maleza a controlar. En cultivos de siembra directa aplicar inmediatamente después de la siembra y en cultivos de trasplante aplicar en pre-trasplante.

Se recomienda aplicar **SELLACROP 400 EC** (i.a. Pendimethalin) una aplicación por campaña como máximo.

6. PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

SELLACROP 400 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

8. FITOTOXICIDAD

SELLACROP 400 EC no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	1 L
Galón	4 L, 10 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L.

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.