

# SPIROCROP DUO 375 SC®

*Spirodiclofen 25% + Fenpyroximate 12.5%*

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**SPIROCROP DUO 375 SC** es un acaricida de amplio espectro de acción utilizado en el control de ácaros fitopatógenos en diversos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Spirodiclofen 250 g/L + Fenpyroximate 125 g/L
Grupo Químico	: Acido tetrónicos (Spirodiclofen), Pyrazole (Fenpyroximate)
Clase de Uso	: Acaricida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
IRAC No.	: 23 (Spirodiclofen), 21A (Fenpyroximate)
Registro PQUA N°	: 2252- SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

## 2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco a amarillo
Densidad	: 1.1 +/- 0.05 g/ml
pH	: 5.0 - 9.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

## 3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

**SPIROCROP DUO 375 SC** es un acaricida que actúa por contacto e ingestión que combina la acción de dos ingredientes activos. Spirodiclofen actúa como inhibidor de la síntesis de ácidos grasos (lípidos) afectando el desarrollo de los ácaros y Fenpyroximate actúa inhibiendo el transporte de electrones en el complejo mitocondrial.

## 4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L		
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.4* 0.5**
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocophtruta oleivora</i>	0.06 – 0.08	14	0.2* 2.0**
Palto	Acaro	<i>Olygonichus punicae</i>	0.06	2	1* 0.2**

PC: Periodo de Carencia      LMR: Límite máximo de residuos      \*Spirodiclofen; \*\*Fenpyroximate  
(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

## 5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia.

Se recomienda realizar como máximo hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días.

# SPIROCROP DUO 375 SC®

*Spirodiclofen 25% + Fenproximate 12.5%*

## 6. PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

## 7. COMPATIBILIDAD

**SPIROCROP DUO 375 SC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

## 8. FITOTOXICIDAD

**SPRIDOCROP DUO 375 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

## 9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

## 10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Envases	0.25 L, 0.5 L, 1 L
Galón	4 L
Bidon	20 L
Cilindros	200 L

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.