

VERTIPLUS GOLD SC®

Thiametoxam 30% + Abamectin 5%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VERTIPLUS GOLD SC es un insecticida - acaricida de amplio espectro utilizado para el control de insectos chupadores, ácaros e insectos formadores de minas que atacan a muchos cultivos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Thiametoxam 30% + Abamectin 5% SC
Grupo Químico	: Neonicotinoide + Avermectin
Clase de Uso	: Insecticida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada
IRAC No.	: 4A (Thiamethoxam), 6 (Abamectin)
Registro PQUA Nº	: 4130 – SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanco-blanquecino de olor ligero
Densidad	: 1040 – 1160 g/L a 20 °C
pH	: 4.0 – 8.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

VERTIPLUS GOLD SC es un insecticida-acaricida actúa por contacto e ingestión, tiene actividad translaminar y sistémica localizada en la planta. Es absorbido vía foliar.

VERTIPLUS GOLD SC está formado por dos ingredientes activos. Abamectin, se basa en su acción específica sobre el ácido γ -aminobutírico (GABA), bloqueando así la transmisión de la señal nerviosa en las uniones neuromusculares, llevando a la parálisis y la muerte de los insectos.

Thiamethoxam actúa en el sistema nervioso central de los insectos de manera persistente como un antagonista de la acetilcolina, deteniendo la alimentación de los insectos irreversiblemente.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plagas		Dosis (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Mandarina	“Arañita roja de los cítricos”	<i>Panonychus citri</i>	0.1 – 0.12	28	0.5* 0.01**
Pimiento	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.1-0.15	7	0.7* 0.02**

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos (*Thiamethoxam, **Abamectin)

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

VERTIPLUS GOLD SC debe ser aplicado cuando se observe los primeros daños del insecto. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga – cultivo.

Se recomienda aplicarlo con un buen volumen de agua, procurando mojar uniformemente todo el follaje para asegurar un buen control de las plagas.

VERTIPLUS GOLD SC®

Thiametoxam 30% + Abamectin 5%

Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega **VERTIPLUS GOLD SC**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

VERTIPLUS GOLD SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente ácida u oxidante.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

VERTIPLUS GOLD SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco	0.25 L, 0.5 L, 1 L
Galón	4 L
Bidón	20 L
Cilindro	200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.