

CIMANIL®

Mancozeb 64% + Cymoxanil 8%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CIMANIL es un fungicida de amplio espectro indicado para el control de en diversos cultivos agrícolas.

Ingrediente Activo/Concentración	: Mancozeb 640 g/kg + Cymoxanil 80 g/Kg
Grupo Químico	: Dithiocarbamato (Mancozeb) Cianocetamidas – oximes (Cymoxanil)
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Polvo Mojable (WP)
No. FRAC	: M03 (Mancozeb), 27 (Cymoxanil)
Registro PQUA N°	: 4529-SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Polvo sólido color azul
Olor	: Olor sulfuroso
pH	: 5.0 – 8.0
Densidad	: 0.3 – 0.4 g/ml
Inflamabilidad	: No inflamable
Corrosividad	: No corrosivo
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

CIMANIL es un fungicida curativo – preventivo a base de cymoxanil y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: cianoacetamidas-oximas y dithiocarbamatos, respectivamente.

CIMANIL tiene acción sistémica y de contacto.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/Ha		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.45 – 0.5	-	7	0.5* 1.0**
Tomate	Hielo fungoso o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 0.75	-	8	0.2* 2.5**
Papa	Hielo o rancha	<i>Phytophthora infestans</i>		0.5 – 0.75	7	0.01* 0.3**
Pimiento	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.4	-	7	0.05* 5**
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2 – 2.5	28	2* 5**

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite máximo de residuos

*Cymoxanil ** Mancozeb

CIMANIL®

Mancozeb 64% + Cymoxanil 8%

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

6. PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

CIMANIL es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

8. FITOTOXICIDAD

CIMANIL no es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 0.50 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.