

BAHIA 400 SC®

Pyrimethanil 40%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BAHIA 400 SC es un fungicida de contacto con acción translaminar, con alta eficacia preventiva y curativa contra enfermedades causadas por hongos.

Ingrediente Activo/Concentración	: Pyrimethanil 400 g/L
Grupo Químico	: Anilinopyrimidine
Clase de Uso	: Fungicida
Tipo de formulación	: Suspensión concentrada (SC)
Nro. De FRAC	: 9
Registro PQUA Nº	: 4142-SENASA
Titular del Registro	: CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	: Líquido blanquecino inodoro
Densidad	: 1.0 – 1.1 g/ml. a 20°C
pH	: 5.0 – 8.0
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

BAHIA 400 SC es un fungicida translaminar que actúa inhibiendo la secreción de enzimas necesarias para la penetración y colonización del hongo en los tejidos vegetales. Este mecanismo interfiere en el proceso de infección, deteniendo el crecimiento del micelio y la propagación del patógeno.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L		
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	1	8

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite máximo de residuos

(En cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país destino)

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña al año, previa evaluación de la plaga y cuando las dosis climáticas sean favorables para su desarrollo. Dosis máxima 1.4 L/Ha. En caso de persistir la plaga, usar otro producto con mecanismo de acción diferente.

6. PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar antes, se deberá usar equipo de protección.

BAHIA 400 SC®

Pyrimethanil 40%

7. COMPATIBILIDAD

BAHIA 400 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

8. FITOTOXICIDAD

BAHIA 400 SC no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío no debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.10 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L

Galonera 5 L

Bidón 20 L

Cilindro 200 L, 1000 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.