LUXOR TOP ®

Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUXOR TOP es un fungicida indicado para el control de enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas. Su formulación contribuye a una protección eficaz del cultivo, ayudando a mantener la sanidad del follaje y otros órganos vegetales bajo condiciones favorables al desarrollo de patógenos.

Ingrediente Activo/Concentración	:	Azoxystrobin 200 g/L + Difenoconazole 125 g/L
Grupo Químico	:	Azoxystrobin: Estrobilurina Difenoconazole: Triazol
Clase de Uso	:	Fungicida
Tipo de formulación	:	Suspensión concentrada (SC)
No. De FRAC	:	Azoxystrobin (11), Difenoconazole (3)
Registro PQUA Nº	:	913 – SENASA
Titular del Registro	:	CROP BUSINESS S.A.C.

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Aspecto físico	:	Líquido amarillo pálido opaco sin olor
Densidad	:	1.10 g/ml a 20 ºC
pH	:	6.0 – 8.0
Punto de inflamación	:	>60 ºC
Inflamabilidad	:	No inflamable
Explosividad	:	No explosivo
Corrosividad	:	No corrosivo
Estabilidad de la emulsión	:	No aplicable

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado en el control de hongos fitopatógenos en diversos cultivos.

LUXOR TOP tiene acción preventiva, curativa y antiesporulante.

LUXOR TOP contiene dos ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción: El Difenoconazole actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, dicho compuesto da fluidez e integridad a la membrana, permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a ella; el Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c1.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

LUXOR TOP ®

Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5%

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.2	0.4	7	1.0* 0.02**
Cebolla	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	0.1	0.3	3	10* 0.05**
Arroz	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	-	0.5	30	5.0* 0.05**
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	-	0.5	21	2.0* 3.0**
Espárrago	Roya del espárrago	*Puccinia asparagi*	0.2	-	100	0.01* 0.05**
Arándano	Cabeza de Clavo	*Alternaria tenuissima*	-	0.5	1	5.0* 0.1**
	Roya del arándano	*Naohidemyces vaccinii*	0.15 - 0.20	-	1	5.0* 4.0**
Pimiento	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.15	-	3	3.0* 0.8**
Mango	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	0.10-0.15	-	7	0.7* 0.07**

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

* Azoxystrobin **Difenoconazole

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de papa y cebolla realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

Para el cultivo de arroz realizar hasta 1 aplicación por campaña.

Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

Arándano y mango: realizar como máximo una (1) aplicación por campaña, considerando una (1) campaña al año.

6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

LUXOR TOP es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

LUXOR TOP ®

Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12.5%

8. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.25 L, 0.5 L y 1 L.
Galón 4 L
Bidón 20 L
Cilindro 200 L

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.
En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005