

RIBBON 250 SG®

Rimsulfuron 25%

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RIBBON 250 SG es un herbicida sulfonilurea muy activo en el control de malezas hojas anchas y gramíneas en proceso de emergencia y recién emergidas en el cultivo de papa cuando se aplica temprano en la emergencia del cultivo con gran duración del control y mínima dosis por área.

Ingrediente Activo/Concentración	: Rimsulfuron 250 g/Kg
Grupo Químico	: Sulfonilurea
Clase de Uso	: Herbicida
Tipo de formulación	: Granulo soluble (SG)
HRAC No.	: 2
Registro PQUA Nº	: 4501 – SENASA
Importado y distribuido por	: CROP BUSINESS S.A.C

2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Apariencia	: Sólido marrón
Olor	: Olor característica leve
pH	: 6.82
Densidad relativa	: 1.268 ± 0.01 (20°C)
Inflamabilidad	: No inflamable
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

RIBBON 250 SG es una sulfonilurea inhibidora de la síntesis de aminoácidos de cadena ramificada, valina e isoleucina, que son esenciales a la división y crecimiento celulares y de allí al crecimiento de la planta.

RIBBON 250 SG es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por follaje y raíces con traslocación rápida a los tejidos meristemáticos. Aplicado en post- emergencia controla gramíneas anuales y perennes, y varias hojas anchas en cultivos como papa.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha		
Papa	"Pata de gallina"	<i>Eleusina indica</i>	0.10 - 0.125	N.A.	0.1
	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>			

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

N.A.: No aplica

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

5. ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se recomienda una (1) aplicación como máximo, considerando una campaña por año.

6. PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD

RIBBON 250 SG puede ser empleado en mezcla con la mayoría de plaguicidas, pero se recomienda hacer una prueba antes de mezclar con otro producto.

RIBBON 250 SG ®

Rimsulfuron 25%

8. FITOTOXICIDAD

RIBBON 250 SG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC**.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa 50gr, 60 gr, 100 gr

11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.