# STARK PLUS 280 SC ®

***Azoxystrobin 20% + Cyproconazole 8%***

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**STARK PLUS 280 SC** desarrollado para el control de enfermedades fúngicas en diversos cultivos.
El producto presenta buena persistencia y distribución en la planta, contribuyendo a un control eficaz y sostenido de enfermedades foliares bajo condiciones favorables al desarrollo del patógeno.

| | |
|---|---|
| Ingrediente Activo/Concentración | : Azoxystrobin 200 g/L + Cyproconazole 80 g/L |
| Grupo Químico | : Azoxystrobin: Estrobilurina<br>Cyproconazole: Triazol |
| Clase de Uso | : Fungicida |
| Tipo de formulación | : Suspensión concentrada (SC) |
| FRAC No. | : Azoxystrobin (11), Cyproconazole (3) |
| Registro PQUA Nº | : 1805 – SENASA |
| Titular del Registro | : CROP BUSINESS S.A.C. |

## 2. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

| | |
|---|---|
| Apariencia | : Líquido blanco a amarillento |
| Olor | : Olor característico |
| pH | : 6.0 – 8.0 |
| Densidad | : 1.10 +/- 0.05 g/l a 20 ºC. |
| Corrosividad | : No corrosivo |
| Punto de inflamación | : > 60 °C. No inflamable |
| Explosividad | : No explosivo |

## 3. MODO Y SITIO DE ACCIÓN

**STARK PLUS 280 SC** es un fungicida compuesto por dos sustancias activas de modo de acción diferente y complementario, posee acción sistémica, translaminar y de contacto que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

**STARK PLUS 280 SC** contiene dos ingredientes activos con diferentes mecanismos de acción:
El Azoxystrobin actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo, impidiendo la producción de energía necesaria para la germinación de esporas y el crecimiento del micelio.
El Cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles, inhibe la biosíntesis del ergosterol, afectando la integridad de la membrana celular y deteniendo el desarrollo del patógeno.


Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

# STARK PLUS 280 SC ®

***Azoxystrobin 20% + Cyproconazole 8%***

## 4. RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo | Plaga | | Dosis | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | L/200L | L/Ha | | |
| Pimiento | Oidium | *Leveillula taurica* | 0.15-0.2 | 0.3-0.4 | 21 | $3.0^{1}$<br>$0.05^{2}$ |
| Esparrago | Mancha del peral | *Stemphylium vesicarium* | - | 0.5 | 30 | $0.01^{1}$<br>$0.1^{2}$ |
| Cebolla | Mancha del peral | *Stemphylium vesicarium* | 0.15 | - | 35 | $10.0^{1}$<br>$0.05^{2}$ |
| Café | Roya del cafeto | *Hemileia vastatrix* | - | 0.5 | 15 | $0.03^{1}$<br>$0.07^{2}$ |

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite máximo de residuos
(1) Azoxystrobin (2) Cyproconazole

## 5. EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Aplicar **STARK PLUS 280 SC** al observarse los primeros síntomas de la enfermedad.
Pimiento y Cebolla: máximo 2 aplicaciones por campaña (2 campañas/año).
Espárrago: máximo 1 aplicación por campaña (2 campañas/año).
Café: máximo 2 aplicaciones por campaña (1 campaña/año). Considerar un intervalo entre aplicaciones de 30 días.
Para la preparación de la mezcla: Llenar el equipo con la mitad de agua requerida, agitar mientras se agrega el **STARK PLUS 280 SC**, mezclar bien y luego agregar la otra mitad de agua.

## 6. PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

## 7. COMPATIBILIDAD

**STARK PLUS 280 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.
Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa antes de usar el producto.

## 8. FITOTOXICIDAD

**STARK PLUS 280 SC** no es fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

## 9. PRECAUCIONES DE USO

Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo. Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo. Para obtener mejores resultados, siempre consulte a un experto agrónomo de **CROP BUSINESS SAC.**


Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005

# STARK PLUS 280 SC ®

***Azoxystrobin 20% + Cyproconazole 8%***

## 10. PRESENTACIONES COMERCIALES

Frasco 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L,
Galón 4 L
Bidón 20 L
Cilindro 200 L

## 11. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:
SAMU: 106

Nota al comprador:

El fabricante garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las indicaciones descritas en la etiqueta. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



Av. Melgarejo 580 Dpto. 301 Urb. Sta. Patricia I Etapa La Molina - Perú
registros@cropbusiness.com Teléfono – 01-3492669 Anexo 1005